

PD DR. MED. J.-P. GUTZWILLER & MED. PRACT. J.-P. RICHTERICH
SPEZIALÄRZTE FMH GASTROENTEROLOGIE
Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil, Tel. 044 720 34 35, FAX 044 720 34 38
praxis@magendarm-thalwil.ch

CONSIGLI PER I PAZIENTI DOPO L'INTERVENTO DELLE EMORROIDI

Oggi abbiamo cominciato con la legatura delle emorroidi. Con un piccolo gommino le ho legato. Dopo 2-5 giorni il gommino va via da solo.

COSA LEI DEVE SAPERE:

Subito o qualche ora dopo questo intervento può manifestarsi una fastidiosa stimolazione dell'alvo. Questo può durare 24-36 ore ed è possibile, in casi rari, che si sentano dei dolori.

Nei giorni seguenti si possono verificare delle perdite di sangue durante la defecazione. Questo non deve spaventarla.

Nel caso in cui si dovessero verificare delle perdite di sangue al di fuori della defecazione ci contatti immediatamente:

Studio: 044 720 34 35
Natel: 079 158 49 53
FAX: 044 720 34 38

Se non sono raggiungibile telefoni all'Ospedale più vicino.

Può prendere le medicinali: Ponstan oppure Panadol.

ATTENZIONE E' MOLTO IMPORTANTE!

Durante tutto il trattamento e dopo 4 settimane dall'ultima visita non possono essere somministrati i medicinali che contengono "acido salicilico":

p.e.. Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirin, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmer, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgin, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS 300, Togonal ASS iC., Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs. Xarelto u.a.

Questi medicinali (anche 1 sola compressa può bastare) possono procurare delle perdite di sangue molto forti.