

PD Dr. med. J.-P. Gutzwiller & med. prakt. J.-P. Richterich  
Spezialärzte Gastroenterologie, Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil  
Tel. 044 720 34 35 / FAX 044 720 34 38  
praxis@magendarm-thalwil.ch

## Merkblatt für Patienten mit Polypektomie

Im Rahmen der Darmspiegelung (Koloskopie) haben wir heute bei Ihnen einen Polypen entfernt. Die Abtragung geschah mittels Schlingenresektion. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen:

Nach der Untersuchung und Abtragung können noch leichte Blutspuren auftreten, die sie nicht beunruhigen müssen. **Sollte jedoch eine starke Blutung unabhängig von der Stuhlentleerung auftreten, müssen Sie uns sofort benachrichtigen.**

Wir sind unter folg. Nummern erreichbar:

**Praxis 044 720 34 35**

**Natel 079 158 49 53**

Falls Sie mich nicht erreichen, suchen Sie die Notfallstation Ihres nächst gelegenen Spitals auf oder benachrichtigen Sie Ihren Hausarzt, der über den Eingriff bereits orientiert sein sollte.

**Als Schmerzmittel erlaubt, falls nötig: Ponstan oder Panadol.**

### **Achtung sehr wichtig!**

**Bis 4 Wochen nach der Polypektomie dürfen Sie keine acetylsalicylsäurehaltigen Medikamente einnehmen:** Dies sind u.a. Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirin, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmerz, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgil, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS 300, Togonal ASS i C, Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs.

**Diese Medikamente können schwere Blutungen auslösen. Bereits die Einnahme von 1 Tablette kann genügen!**