

PD Dr. med. J.-P. Gutzwiller & Med. Pract. J. P. Richterich  
Fachärzte FMH für Magen- und Darmkrankheiten  
Zürcherstrasse 61, 8800 Thalwil  
Tel. 044 720 34 35, FAX 044 720 34 38  
praxis@magendarm-thalwil.ch

## **CONSIGLI PER I PAZIENTI DOPO L'INTERVENTO DEI POLIPI**

Oggi durante la coloscopia le abbiamo tolto un polipo. In questo caso è molto importante a sapere che :

Dopo aver estratto il polipo si possono verificare delle piccole perdite di sangue il quale è normale.

**In caso di perdite molto forti ci contatti immediatamente :**

<b>Studio</b>	<b>044 720 34 35</b>
<b>Natel</b>	<b>079 158 49 53</b>
<b>FAX</b>	<b>044 720 34 38</b>

**Se non sono raggiungibile telefoni all'Ospedale più vicino.**

**Può prendere le medicine : Ponstan oppure Pandol.**

### **ATTENZIONE E MOLTO IMPORTANTE !**

**Entro 4 settimane non possono essere somministrati i medicinali che contengono acido salicilico :**

p.e.. Alcacyl, Alka-Seltzer, Asasantin, Aspégic, Aspirin, Aspro 500, Colfarit, Contra-Schmer, Enterosarine, Febradolor, Fortalidon, Fribagyl, Malex, Neo-Cibalgin, Rhonal, Robaxisal, Silentan, Synthol, Thomapyrin, Togonal ASS iC, Treupel, Triplex, Upsalgin C, Tiatral, Rumatral, Lyman Tabs. U.a.

**Questi medicinali (anche 1 sola compressa può bastare) possono procurare delle perdite di sangue molto forti.**